

A negatív neurológiai status

Meningealis izgalmi jelek:

A tarkója szabad és egyéb meningealis izgalmi jelek /Kernig, Brudzinski/ sincsenek.

Agyidegek:

- I. Mk. o. a szagokat felismeri, egyenlő erősségűnek jelzi.
- II. Visusa mk. o. 1,0. A látóterek frontális vizsgálattal épek. Fundusain a papillák éles határuak, vitalis színűek, a physiologiás excavatio megtartott. Az erek aránya normális. Vérzés, degenerációs folt, pigment-zavar vagy egyéb kóros eltérés a retina belátható részén nem észlelhető.
- III-IV-VI. A pupillák közepesen tágak, kerek, egyenlők, ép szélűek, centralis elhelyezkedésűek. Fényre direkte és consensualisan, valamint accommodatióra és convergentiára jól reagálnak. A szemmozgások conjugáltak és szabadok, a vezetett, fürkésző és parancsolt szemmozgások egyaránt jól sikerülnek. Nystagmus nem látható, kettősképet nem jelez. A szemrések egyenlő tágasságúak, pillacsapás symmetricus.
- V. A rágóizmok tömege, tónusa és consistenciája normális, ráharapáskor a masseterok és temporalisok erőteljesen, egyenlően megfeszülnek. Szájnyitáskor az állcsúcs nem deviál, az állkapocs előre-hátra és mindkét oldalra erőteljesen, jól mozgatható. A vattaérintést, tűszúrást és a hideg-meleg ingereket mk. arcfélen, mindhárom ág területén felismeri és egyenlő erősségűnek jelzi. Az arc bőrére írt számokat felismeri. A végágak kilépési pontjai nem nyomásérzékenyek. A cornea reflex /trigemino-facialis reflex/ mko. közepesen élénk, egyenlő.
- VII. A homlokráncolás, szemhéjzárás, orrszárnyemelés és a fogmutatás mk. o. erőteljes, egyenlő. Az emotionalis mimikai mozgások is symmetricusak. A nyelv elülső 2/3-án az alapízeket felismeri, két oldalon egyenlő erősségűnek jelzi.
- VIII. A sügött beszédet mk. o. 5 m-ről jól hallja. A Weber próba végtelen. A Rinné mk. o. pozitív, a Schwabach mk. o. normális.
- IX-X. A nyelés és a hangképzés zavartalan. Az uvula közepre mutat, hangadáskor a lágyszájpad mk. o. egyenlő, jól mozog. A garat- és lágyszájpadreflexek mk. o. közepesen élénkek, egyenlők. A nyelv hátsó 1/3-án az ízeket ko. felismeri.
- XI. A m. sternocleidomastoideus és trapezius tömege, tónusa mk. o. normális. A vállmelés és a fejfördítés erő ellenében is mk. o. erőteljes, egyenlő.
- XII. A kiöltött nyelv nem deviál, jól mozgatható, nem sorvadt, nem fasciculál.

Gerincvelő mozgatókör:

A vázizomzat tömege, térfogata és consistentiája normális, a végtagizomzat normotóniás. Sorvadás, fasciculatio nem észlelhető. A kezek szorítóereje mk. o. erőteljes, egyenlő, a párhuzamosan felemelt végtagokat megtartja. /Részletes elemzésnél vizsgáljuk a következőket: a kezujjak flexiója és extenziója, külön és a többi ízületben; a kezujjak közelítése és távolítása; a pollex adductiója és oppositioja; a gyűrűképzés ereje; a csukló palmar- és dorsalflexiója, radialis és ulnaris flexiója; a könyökhajlítása, feszítése, pronatio és supinatio; a vállízület ante- és retroflexiója, ab- és adductiója; ki- és befelé rotációja; a karok előre emelésekor scapula alata képződése; az alsó végtagon a hallux dorsalflexiós ereje, a láb dorsal- és plantarflexiója és supinatioja; a térdek hajlítása és feszítése, a combok ab- és adductiója, a csípő hajlítása, feszítése, ki- és befelé rotációja; - lábujjhegyen és sarkon állás és járás, fél lábon állva térdhajlítás, guggoló helyzetből való felállás/.

Gerincvelői érzőköri:

Subjectiv-érezszavar nincs. A vattaérintést, tűszúrást, a hideg-meleg és vibrációs ingereket testszerte helyesen jelzi, két oldalon egyenlő erősségűnek mondja. Az ízület helyzet- és mozgásérzés megtartott. A bőrre írt számokat felismeri.

Gerincvelői reflexkör:

A biceps, triceps, radius és ulna reflexek közepesen élénkek, kétoldalt egyenlőek. A Mayer és Léri mk. o. jól kiváltható. A patella és Achilles reflexek szintén közepesen, kétoldalt egyenlően élénkek. Mk o. talpi hajlítás. A hasbőr- és cremaster reflexek kp. élénkek, ko. egyenlőek. Pyramis jel, liberatiós tünet nem észlelhető.

Mozgás-coordinatio:

Az ülés, állás és járás biztonságos, harmónikus mozgással történik. Az orr-ujjhegy és térd-sarok kísérletet mk. o. jól végrehajtja, az ellentétes irányú mozgásokat gyorsan és ügyesen végzi. Ataxia, dysmetria, dysdiadochokinesia nem észlelhető. Romberg /és sensibilisált Romberg/ helyzetben jól megáll, a Bárány kísérletet pontosan elvégzi, a vakj járás /és kötél táncos vakj járás/ iránytartó. Akaratlan kóros mozgás nem észlelhető.

Vegetativum:

Normális vaso-, sudo- és pilomotoros tevékenység.
Sphincter /vagy potencia/ zavarra utaló panasz, tünete nincs.

Tudat megítélése, gnosztikus funkciók:

Éber. Aphasia, apraxia, agnosia nincs.

Tájékozódó psychés vizsgálat:

Megjelenése rendezett, adaequat kapcsolat teremthető, jól cooperál. Térben, időben, auto- és allopsychésen orientált. A felfogás, a figyelem és az emlékezőműködés épnek tűnik. Emotionalis megnyilvánulásai adaequatak. Érzéksalódás vagy kóros tudattartalom gyanúja nem merül fel. Iskolai végzettség, foglalkozását, életkorát és egyéb szituatív körülményeit figyelembe véve intelligenciája átlagosnak látszik.